


Modified Blalock-Taussig Shunt (MBTS)

Qalliinka Beddelan ee Dhiigkordhinta Sambabka ama MBTS



© 2012 The Children's Heart Clinic

Ogeysiis:

The Children's Heart Clinic, 2530 Chicago Avenue S, Ste 500, Minneapolis, MN 55404
612-813-8800 * Toll Free: 1-800-938-0301 * Fax: 612-813-8825
Children's Hospital of Minnesota, 2525 Chicago Avenue S, Minneapolis, MN 55404

Qalliinka Beddelan ee Dhiigkordhinta Sambabka ama MBTS Modified Blalock-Taussig Shunt (MBTS)

Badanaa Modified Blalock- Taussig Shunt (Qalliinka Beddelan ee Dhiigkordhinta Sambabka ama MBTS) waxaa la sameeyaa xilliga ilmuhu ku jiro qeybta daaweynta dhallaanka si loo saxo heerka ogsijiinta hooseysa marka uusan qulqulka dhiiggu ka filneyn sambabka oo aan ku filnayn, dhiiggaas oo ka imaanaya qaabka gaarka ah ee ilmaha ku dhasha xanuunka wadnaha.

In la furo bartanka shafka (jeexidda qeybta dhexe) ayaa la sameynayaa ama ah dhinaca ayaa qalid-dhinaceed (jeexidda gees oo ah qaarka sare) ayaa lagu sameynayaa. Wadne-sambabka macmalka ah (mashiinka wadne-sambabka) ayaa la isticmaali karaa ama la iska deyn karaa, waxa ay ku xiran tahay qorshaha qalliinka. Inta uu socdo qalliinka, qeyb ka mid ah Gore-tex® tuubada graft (Gore) ayaa dherer ku habboon laga soo goynayaa, jeexid ayaa lagu samenayaa halbowlaha jirrida ah, oo tuubada lagu dhajinayo ayaa lagu tolalaha halbowlaha. Jeexid kale ayaa markaas lagu sameynayaa halbowlaha sambabka oo qeybta dambe ee tuubada Gore-tex® (Gore) ayaa lagu tolalaha meeshii la jeexay. Sidaas ayaa la isugu xirayaa inta u dhaxaysa habdhiska habka halbowleyaasha iyo habdhiska halbowlaha sambabka oo waxaa kordhaya xaddiga qulqulka dhiigga sambabka (sanbabada), oo waxaa badanaya cufka ogsijiin.

Hawlgalka Caadiga ah ee Qalliinka Ka-dib:

- Wakhtiguu Qaadanayo Qalliinka: 2 ilaa 4 saac
- Qalabka Tuubooyinka: Waxaa ilmaha badankooda lagu soo celinayaa Xarunta Daryeelka Wadnaha ka dib qalliinka oo waxaa lagu xiri doonaa tuubbo ah neefsashada, mid halbowle oo lagula soconayo cadaadiska dhiigga, mid kale oo ah xididdada (mid ah faleebbe daawo laga qaato iyo in dhiig laga qaado), faleebbe bannaanka ah, tuubooyinka xabadka ah oo dheecaanka looga daadinayo, kateetaraha Foley oo ah kan kaadidu geleyso, iyo mararka qaarood xargaha bartariga wadnaha oo meelgaar ah.
- Soo-kabashada Caadiga ah Qalliinka Ka-Dib: Tuubada neefsashada ayaa badanaa laga saarayaa maalinta koowaad ka dib qalliinka. Tuubada xididdada bartamaha waxaa laga bixinayaa marka laga joojiyo ee aan loo baahneyn in mar dambe la isticmaalo. Tuubooyinka xabadka waxaa badanaa laga saarayaa maalinta qalliinka ka dib, marka uu yaraado dheecaanka ka soo baxaya. Wax yar ka dib qalliinka, ilmaha waxaa la siinayaa heparin looga hortagayo xinjirowga tuubbada. Marka ilmuhu si fiican wax u cunayo, aspirin ayaa loo bilaabayaa oo waxaa laga joojinayaa heparin. Aspirin waa in lagu sii wado guriga ilaa la gaaro wakhtiga qalitaanka wadnaha ee xiga.
- Muddada Seexinta Isbitaalka: Wuxuu ilmuhu isbitaalka joogayaa badanaa 7 ilaa 10 maalmood ka dib marka loo geliyo MBTS.

Qaashada Daawooyinka Guriga: Carruurtu waxa ay u baahan karaan hal daawo ama in ka badan in ay guriga u qaataan ka dib MBTS sida:

- Daawada biyaha saarta (Lasix) si looga xakameeyo dareeraha
- Daawada dhiigga jilcisa (Aspirin, Lovenox) looga hortago xinjirowga
- Walax ah dhimista culeyska si wadnaha looga yareeyo dhiigkarka yo hawsha badan (Enalapril, Captopril)
- Hagaajinta wadnaha ee shaqada/daaweynta garaacista khaldan (daawada Digoxin)